

## Pšenica potravinárska

Zrno potravinárskej pšenice letnej

STN 46 1100-2

Technické požiadavky a požiadavky na kvalitu

Pestovateľ alebo dodávateľ je povinný deklarovať odrodu a rok zberu.

Požiadavky na kvalitu

Parameter		Trieda kvality			
		E	A	B	P
vlhkosť, hmot. % najviac		14	14	14	14
objemová hmotnosť, g/l najmenej		780	760	730	750
obsah dusíkatých látok (N x 5,70) v sušine, hmot. % najmenej		12,5	11,5	10,5	9,5
číslo poklesu v štrote zo 7 g, s najmenej		220	220	220	160
sedimentačný index podľa Zelenyho, ml najmenej		30	25	22	
nečistoty spolu, hmot. % najviac		5	5	12	6
z toho:	a) zlomky zrn, hmot. % najviac	2	3	5	3
	b) zrnové nečistoty, hmot. % najviac	2	5	7	3
z toho: - scvrknuté zrná, hmot. %					
- zrná iných obilnín, hmot. %					
- zrná poškodené škodcami, hmot. %					
- zrná so zmenenou farobu klíčka, hmot. %					
- zrná poškodené teplom, hmot. % najviac		0,5	0,5	0,5	0,5
	c) naklíčené zrná, hmot. % najviac	1	2,5	4	2
	d) ostatné nečistoty, hmot. % najviac	0,5	1	3	1
z toho: - cudzie semená, hmot. %					
z toho škodlivé, hmot. % najviac		0,1	0,1	0,1	0,1
- poškodené zrná, v hmot. %					
z toho poškodené teplom, hmot. % najviac		0,05	0,05	0,05	0,05
- cudzorodé zložky, hmot. %					
- plevy, hmot. %					
- námeľ, hmot. % najviac		0,05	0,05	0,05	0,05
odporúčaný znak kvality:					
obsah mokrého lepku v sušine (test G0), hmot. % najmenej		27	25	23	20

Pozn.:

Škodlivé semená sú definované v STN 46 1100-1 ako škodlivé nečistoty.

Okrem požiadaviek predpísaných v tejto norme, zrno potravín. pšenice letnej musí zodpovedať STN 46 1100-1.

Zdravotná nezávadnosť

Zrno potravinárskej pšenice letnej musí byť zdravé, vyzreté, bez živých škodcov vrátane roztočov vo všetkých

štádiách vývoja a cudzích pachov.

Nesmie obsahovať zrná zhnité, nahnité, plesnivé a naplesnivené, zrná napadnuté plošticou a snet'ou.